



PROVA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – DOR – 2025

DATA: 26/11/24

NOME DO CANDIDATO:

1. De acordo com a MTC, a Síndrome Bi apresenta sintomas de dor, sensibilidade ou formigamento, provenientes da obstrução da circulação do Qi e do Sangue nos meridianos, causados por invasão externa de Vento, Frio ou Umidade. Diante essa afirmativa, quais os principais pontos para tratar DOR referente a Síndrome Bi por Umidade ou Tipo Fixa?

- a) B11, B12, VB20, VB31, VB39, VG14, TA6, F3
- b) E36, VC6, ID5, B10, VG14, VG3, B23 e VC4
- c) BP9, BP6, VB34, E36, E40, B20
- d) E43, E44, IG4, IG11, VG14, F2, TA5

2. São alterações comuns no processo de envelhecimento fisiológico sobre as estruturas envolvidas no processamento e modulação da dor, exceto:

- a) Ocorre redução do número de fibras amielínicas
- b) Maior número de sinapses colaterais
- c) Perda de neurônios noradrenérgicos e serotoninérgicos no corno posterior da medula
- d) Acúmulo de placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares

3. Qual os níveis mais frequentemente acometidos por hérnia de disco cervical?

- a) C2 – c3 , c3-c4
- b) C1-c2, c2-c3
- c) C5-c6, c6-c7
- d) C4-c5, c5, c6

4. Sobre o mecanismo de ação da Toxina Botulínica para o tratamento de Dor é correto afirmar:

- a) O mecanismo de ação se dá principalmente pela inibição da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas.
- b) O mecanismo de ação está envolvido na via de inibição da síntese de prostaglandina
- c) O Mecanismo de ação se dá pela inibição de recaptção das monoaminas norepinefrina e serotonina.
- d) O mecanismo de ação se dá através de ligação aos receptores do tipo Mu no sistema nervoso central (SNC), causando inibição das vias ascendentes da dor.

5. A manobra de Laségue apresenta variações. Ligue os epônimos aos achados físicos.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| I – Sinal de Bragard | (A) Acentuação da dor ciática pela tosse |
| II – Sinal de Sicard | (B) Acentuação da dor pela dorsiflexão do pé |
| III – Sinal de Neri
flexão truncal | (C) Flexão do joelho no lado afetado em resposta |
| IV – Sinal de Naffziger | (D) Acentuação da dor pela dorsiflexão do hálux |

A correta associação é:

- a) I-D, II-B, III-C, IV-D.
- b) I-D, II-B, III-D, IV-C.
- c) I-B, II-D, III-C, IV-A.
- d) I-B, III-D, II-C, IV-A.

6. No ser humano, o desenvolvimento da percepção sensorial de todas as superfícies cutâneas e mucosas completa-se a partir de:

- a) 12 semanas de gestação.
- b) 20 semanas de gestação.
- c) 36 semanas de gestação.
- d) No segundo ano de vida, com a mielinização.

7. Após episódio de AVC (acidente vascular cerebral), o desenvolvimento de dor crônica, com alodinia e hiperpatia em hemicorpo e agravamento por estresse emocional ou cansaço, é sugestivo de:

- a) Distrofia simpática reflexa.

- V* 2016 0 W
- b) Seqüela meníngea.
 - c) Lesão Talâmica.
 - d) Processo de reorganização cognitiva.

8. Compressão radicular de C8 pode apresentar caracteristicamente a seguinte distribuição metamérica:

- a) Dor referida em ombro e braço
- b) Alteração dos reflexos braquioradial e do polegar
- c) Disfunção sensitiva do indicador e do dedo médio
- d) Dor referida para território ulnar do antebraço e quinto dedo

9. Você está montando uma Clínica de Dor, e está realizando a seleção dos Profissionais de Saúde que farão parte da Equipe Multidisciplinar dessa clínica. A respeito da seleção dos psicólogos, você gostaria de ter ao menos um psicólogo que seja especialista no subtipo de Terapia Cognitivo-Comportamental, com maior evidência no Tratamento da Dor Crônica. Qual alternativa abaixo indica tal "subtipo"?

- a) Terapia Comportamental
- b) Terapia Cognitiva
- c) Terapia Comportamental Dialética
- d) Terapia de Aceitação e Compromisso

10. (TEXO PARA QUESTÕES 10 E 11) Você atende um paciente do sexo masculino de 27 anos, previamente hígido e que refere dor profunda ao redor do olho há cerca de um mês. A dor é intensa, não latejante, irradiada para a região frontal e ocorre várias vezes ao dia, cessando em 24 horas. O exame físico é absolutamente normal. Qual o diagnóstico mais provável deste paciente?

- a) Neuralgia do trigêmeino.
- b) Síndrome de Tolosa-Hunt.
- c) Enxaqueca.
- d) Cefaleia em salvas.

11. Que outro sinal físico pode ser encontrado neste paciente?

- a) Síndrome de Horner.
- b) Afasia.
- c) Fraqueza da mão.
- d) Diplopia.

12. Qual a definição de dor neuropática mais atual?

- a) Dor como consequência direta de lesão de nervo causando sintomas sensitivos negativos.
- b) Dor como consequência direta de lesão ou de doença que afeta o sistema somatossensitivo.
- c) Dor como consequência direta de lesão afetando o sistema somatossensitivo.
- d) Dor como consequência direta de lesão da via nociceptiva levando a sintomas sensitivos negativos.

13. Você atende uma mulher de 60 anos, previamente hígida, referindo dor facial em facada em região mandibular e maxilar. A dor era usualmente iniciada após a escovação dentária, com pobre resposta clínica aos analgésicos comuns. Ao exame neurológico: sem alterações. Nesta situação, qual o diagnóstico mais provável?

- a) Neuralgia trigeminal idiopática.
- b) Neuralgia trigeminal sintomática.
- c) Síndrome de Tolosa-Hunt.
- d) Dor facial atípica.

14. Na dor episódica do pacientes com câncer, está correto afirmar que:

- a) É devida exclusivamente à dor incidental, ou seja, àquela associada à atividades como tosse, deambulação ou fisioterapia.
- b) Pode não ter relação com nenhuma atividade ou evento.
- c) Não tem relação com dose ou intervalo de prescrição de analgésicos.
- d) Fármacos utilizados em dor neuropática estão contraindicados na dor episódica.

15. Na espondilite anquilosante NÃO é verdadeiro afirmar que:

- a) Mais de 90% apresentam anticorpos para o antígeno HLA-B27.
- b) A coluna assume uma forma em bambu.
- c) A radioterapia está indicada amplamente como tratamento.
- d) A indometacina é uma escolha natural no seu tratamento e ador ciática pode ocorrer precocemente.

16. Existem situações nas quais a dor miofascial apresenta sintomas que podem ser confundidos com dor neuropática. Quais são essas situações?

- a) Quando a dor miofascial é no adutor curto do polegar, pois os sintomas são parecidos com a síndrome do canal do carpo.
- b) Nunca uma dor miofascial poderá ser confundida com dor neuropática

- c) Quando a dor miofascial é no quadríceps crural, pois pode provocar sintomas parecidos com os da meralgia parestética.
- d) Quando a dor miofascial é no glúteo menor, pois pode dar dor referida para o membro inferior, simulando radiculopatia.

17. A Síndrome de Grisel caracteriza-se por:

- a) Lesão articular em L1-L2.
- b) Lombalgia severa associada à tuberculose na coluna.
- c) Dessaranjo articular entre C1-C2.
- d) Complicação da hérnia de disco não tratada.

18. Sobre a síndrome fibromiálgica (SFM), podemos afirmar que:

- a) Tem como sintoma principal a depressão maior.
- b) A síndrome das pernas ou braços inquietos manifesta-se em 60% dos casos de SFM.
- c) O fator antinúcleo é positivo em 10% dos casos de SFM, não sendo significativamente diferente do encontrado no grupo controle.
- d) O tratamento de afecções metabólicas ou inflamatórias, incluindo hipotireoidismo e diabetes melitos (DM) implica regressão das manifestações clínicas da SFM.

19. Carcinomatose meníngea manifesta-se principalmente em neoplasias de:

- a) Pâncreas, pulmão e rim
- b) Mama, estômago, fígado
- c) Mama, pulmão e melanoma
- d) fígado, pulmão e estômago

20. Ao examinar uma mulher de 30 anos, obesa, com queixa de dor e formigamento em mão direita, achamos o sinal de Tinel positivo para nervo mediano à direita. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta:

- a) Devemos encaminhá-la para a realização de uma eletroneuromiografia de membros superiores – hipótese provável: síndrome do túnel do carpo.
- b) Devemos medicá-la com anti-inflamatórios, por se tratar de provável tendinite de De Quervain.
- c) Devemos encaminhá-la com urgência para realizar uma ressonância magnética de membro superior direito, por risco de sinovite maligna.
- d) Devemos medicá-la com anti-inflamatórios, por se tratar de uma possível sinovite maligna.

21. Você atende um homem de 60 anos previamente hígido, que apresentou um episódio de dor lombar inferior após o levantamento de um televisor da altura do chão a uma mesa. A dor era aguda e intensa, irradiando da nádega esquerda à coxa posterior e face lateral da panturrilha. Tosse e valsalva precipitavam dor adicional nessa região, mas o decúbito dorsal com as pernas fletidas aliviava a dor. Quais as raízes mais provavelmente afetadas nesse quadro clínico?

- a) L2-L3.
- b) L3-L4.
- c) L4-L5.
- d) L5-S1.

22. Qual a causa mais provável de dor neuropática nos pacientes com polineuropatia de fibras finas?

- a) Perda de células nervosas epidérmicas.
- b) Hiperatividade do sistema nervoso simpático.
- c) Geração ectópica de descargas aferentes por axônios terminais.
- d) Tratos espinotalâmicos.

23. Existem várias teorias sobre a fisiologia da dor. Por favor, conecte as teorias aos investigadores que as propuseram:

- | | |
|---------------------|--|
| I – Von Frey | (A) Existem dois sistemas sensitivos: protopático (dor/ temperatura) e epicrítico (tato) |
| II – Goldscheider | (B) A dor é resultado da somação de impulsos aplicados sobre a pele |
| III – Head e cols | (C) A estimulação de fibras grossas atenua a transmissão das fibras da dor |
| IV – Melzack e Wall | (D) Existem sítios sensitivos cutâneos que dão origem a sensações específicas . |

A associação correta é:

- a) I-D, II-C, III-A, IV-B.
- b) I-D, II-B, III-A, IV-C.
- c) I-B, II-D, III-A, IV-C.
- d) I-B, II-D, III-C, IV-A.

24. O que representa uma onda F na ENMG (ELETRONEUROMIOGRAFIA)?

- a) Uma resposta ao estímulo sensorial contínuo.
- b) Uma resposta tardia que indica a condução retrógrada no nervo motor.
- c) O movimento voluntário do músculo avaliado.
- d) A função do neurônio motor.

25. Dos miorrelaxantes abaixo, um é derivado do GABA(ácido gama-amino-butírico):

- a) Orfenadrina
- b) Tizanidina
- c) Carisoprodol
- d) Baclofeno



PROVA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – DOR – 2025

DATA: 26/11/24

NOME DO CANDIDATO:

GABARITO

	A	B	C	D
1			✓	
2		✓		
3			✓	
4	✓			
5			✓	
6		✓		
7			✓	
8				✓
9				✓
10				✓
11	✓			
12		✓		
13	✓			
14		✓		
15			✓	
16				✓
17			✓	
18			✓	
19			✓	
20	✓			
21				✓
22			✓	
23		✓		
24		✓		
25				✓